

平成29年度 丹波篠山黒枝豆栽培履歴書

生産者氏名	
住所	篠山市
電話番号	079- -

	ほ場No. 1	ほ場No. 2	ほ場No. 3
ほ場地番			
面積 (a)	アール	アール	アール
種子・苗	自家種子・JA種子・その他 ()	自家種子・JA種子・その他 ()	自家種子・JA種子・その他 ()
栽培区分	直播・移植	直播・移植	直播・移植
作業	作業月日	作業月日 (□ ほ場No. に同じ)	作業月日 (□ ほ場No. に同じ)
耕起	/	/	/
畦立て	/	/	/
は種	/	/	/
定植	/	/	/
収穫	/	/	/

区分	肥料名	施肥基準量	作業月日	kg/10a	作業月日 (□ ほ場No. に同じ)	kg/10a	作業月日 (□ ほ場No. に同じ)	kg/10a
土づくり	完熟堆肥	2,000kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	アツミン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	ハレー28号	200kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
元肥	有機石灰セルカ	60kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	パワーリン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	セラコートR555	60kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
追肥	丹波黒大豆スペシャル	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	PK化成40号	20kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	亜りん酸粒状1号	2kg/10a	/ /	kg	/ /	kg	/ /	kg
	ホスプラス	500倍	/ /		/ /		/ /	
	NK化成2号	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg

区分	農薬名	希釈倍数・使用量	適用病害虫・雑草	使用時期	使用方法	作業月日				作業月日 (□ ほ場No. に同じ)				作業月日 (□ ほ場No. に同じ)			
殺虫剤	アドマイヤー1粒剤	3kg/10a	アブラムシ類	は種時	播溝土壌混和	/	合わせて1回	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		育苗トレイ (30×60cm) 1箱当り50g			育苗トレイの培土に均一に混和	/											
	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	ネキリムシ類	定植時	土壌表面散布	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルホス粉剤	4kg/10a	ネキリムシ類	は種時または定植時	作条施用土壌混和	/	合わせて1回	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					は種時～本葉2葉期	土壌表面散布											
	スミチオン乳剤	1,000倍	マメシクイガ・マメヒメサヤムシガ・カメムシ類・アブラムシ類	収穫21日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トレボン乳剤	1,000倍	カメムシ類、マメシクイガ、ハスモンヨトウ、フタスジヒメハムシ	収穫14日前まで	散布	/	/	合わせて2回以内	/	/	合わせて2回以内	/	/	合わせて2回以内	/	/	合わせて2回以内
	トレボン粉剤DL	4kg/10a	マメシクイガ・カメムシ類	収穫14日前まで	散布	/	/		/	/		/	/		/	/	
	アディオソ乳剤	3,000倍	マメシクイガ・アブラムシ類・ヨトウムシ類	収穫14日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	アグロスリン乳剤	2,000倍	マメシクイガ・カメムシ類・フタスジヒメハムシ	収穫7日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	プレバソフロアブル5	4,000倍	ハスモンヨトウ・マメシクイガ	収穫3日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ニッソラン水和剤	2,000倍	ハダニ類	収穫21日前まで	散布	/	/		/	/		/	/		/	/	
ダニトロンフロアブル	1,000倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/			/			/			/			
コロマイト乳剤	1,500倍	ハダニ類	収穫前日まで	散布	/	/		/	/		/	/		/	/		
殺虫殺菌剤	クルーザー MAXX	8ml/乾燥種子1kg	茎疫病・黒根腐病・紫斑病・アブラムシ類・タネバエ・ネキリムシ類	は種前	塗抹処理	/			/			/			/		
	キヒゲンR-2フロアブル	20ml/種子1kg	紫斑病・苗立枯病・タネバエ	は種前	塗抹処理	/			/			/			/		
殺菌剤	Zボルドー粉剤DL	3kg/10a	茎疫病	-	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zボルドー (水和剤)	500倍	斑点細菌病・べと病	-	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ランマンフロアブル	1,000倍	茎疫病・べと病	収穫3日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ライメイフロアブル	2,000倍	茎疫病・べと病	収穫3日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
除草剤	ラウンドアップマックスロード	500ml/10a	一年生雑草	耕起前又は出芽前まで	雑草茎葉散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
				収穫前日まで	雑草茎葉散布 畦間処理	/	/	合わせて3回以内	/	/	合わせて3回以内	/	/	合わせて3回以内	/	/	合わせて3回以内
	バスタ液剤	500ml/10a	一年生雑草	は種前	雑草茎葉散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	合わせて3回以内
				定植5日前まで	雑草茎葉散布	/	/	/	合わせて3回以内	/	/	/	合わせて3回以内	/	/	/	合わせて3回以内
	クリアターン乳剤	700ml/10a	一年生雑草	は種直後 (雑草発生前)	全面土壌散布	/	合わせて1回			/	合わせて1回			/	合わせて1回		
				定植3日前まで (雑草発生前)	全面土壌散布	/				/				/			
トレファノサイド乳剤	300ml/10a	一年生雑草	定植前 (植穴掘前)	全面土壌散布	/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回			/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回			/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回			
			は種後発芽前	畦間土壌散布	/				・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)				/				・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)
トレファノサイド粒剤2.5	6kg/10a	一年生雑草	定植前 (植穴掘前)	全面土壌散布	/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)						/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)				
			は種後発芽前	畦間土壌散布	/							/					
					/	/	/	/				/	/	/	/		
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

栽培履歴確認者印 印

